

UWIS, Mathematik 1, Lösung Serie 10

Thomas Kuster

18. Januar 2004

1 Differentialgleichungen**1.1**

$$\begin{aligned}
x \frac{d}{dx}(1+t) &= x^2 \\
(1+t)dx &= x^2 dt \\
\int 1+t dx &= \int x^2 dt \\
-\frac{1}{x} + c_1 &= \ln(1+t) + c_2 \quad c = c_2 - c_1 \\
x &= \frac{-1}{\ln(1+t) + c}
\end{aligned}$$

1.2

$$\dot{x} = -2x + e^{3t}$$

homogene Lösung:

$$\begin{aligned}
\dot{x}_h &= -2x_h \\
x_h &= c_1 e^{-2t}
\end{aligned}$$

Ansatz $C(t)c_1 e^{-2t}$ (auch $x = c_1 e^{-2t} + A e^{3t}$ möglich):

$$\begin{aligned}
\dot{C}(t)c_1 e^{-2t} + C(t)c_1(-2)e^{-2t} &= -2C(t)c_1 e^{-2t} + e^{3t} \\
\dot{C}(t)c_1 e^{-2t} &= e^{3t} \\
\dot{C}(t) &= \frac{e^{3t}}{c_1 e^{-2t}} \quad c_2 = \frac{1}{c_1} \\
\dot{C}(t) &= c_2 e^{3t} e^{2t} \\
\dot{C}(t) &= c_2 e^{5t} \\
C(t) &= \frac{c_2}{5} e^{5t}
\end{aligned}$$

Lösung:

$$\begin{aligned}
x &= \frac{c_2}{5} e^{5t} c_1 e^{-2t} \quad c = c_1 c_2 \\
x &= \frac{c}{5} e^{3t}
\end{aligned}$$

1.3

$$\begin{aligned}
\dot{x} + x \sin(t) &= \sin(t) \\
\dot{x} &= -x \sin(t) + \sin(t) \\
\dot{x} &= \sin(t)(1-x) \\
\frac{\dot{x}}{(1-x)} &= \sin(t) \\
\frac{dx}{(1-x)dt} &= \sin(t) \\
\frac{1}{(1-x)} dx &= \sin(t) dt \\
\int \frac{1}{(1-x)} dx &= \int \sin(t) dt \\
\ln(1-x) &= -\cos(t) + c_1 \\
1-x &= e^{-\cos(t) + c_1} \\
x &= 1 - e^{-\cos(t) + c_1} \\
x &= 1 - c e^{-\cos(t)}
\end{aligned}$$

2 Newtonverfahren

Die Tangente der Funktion f an der Stelle x_0 (nullte Näherung der Nullstelle der Funktion f) wird mit der x -Achse geschnitten, dieser Schnittpunkt ergibt den neuen Punkt x_1 (erste Näherung der Nullstelle der Funktion f).

$$\begin{aligned}
f(x_n) + f'(x_n)(x_{n+1} - x_n) &= 0 \\
f(x_n) + f'(x_n)x_{n+1} - f'(x_n)x_n &= 0 \\
f(x_n) - f'(x_n)x_n &= -f'(x_n)x_{n+1} \\
\frac{f(x_n)x_n - f(x_n)}{f'(x_n)} &= x_{n+1}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
f(x) &= \tan x - x \\
f'(x) &= 1 + \tan^2 x - 1 = \tan^2 x
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{(\tan^2 x_n) x_n - (\tan x_n - x_n)}{\tan^2 x} &= x_{n+1} \\ \frac{(\tan^2 4.5) 4.5 - (\tan 4.5 - 4.5)}{\tan^2 4.5} &= 4.4936 \\ \frac{(\tan^2 4.49) 4.49 - (\tan 4.49 - 4.49)}{\tan^2 4.49} &= 4.4934\end{aligned}$$

3 Mac Laurinsche Reihen

3.1

3.1.1

$$\begin{aligned}f(t) &= (1+t)^{\frac{1}{2}} \\ f'(t) &= \frac{1}{2}(1+t)^{-\frac{1}{2}} \\ f''(t) &= -\frac{1}{4}(1+t)^{-\frac{3}{2}} \\ f'''(t) &= \frac{3}{8}(1+t)^{-\frac{5}{2}} \\ f^{(4)}(t) &= -\frac{15}{16}(1+t)^{-\frac{7}{2}} \\ T(t) &= (1+0)^{\frac{1}{2}} + \frac{1}{2}(1+0)^{-\frac{1}{2}}(t-0) - \frac{1}{4}(1+0)^{-\frac{3}{2}}(t-0)^2 \frac{1}{2} \\ &\quad + \frac{3}{8}(1+0)^{-\frac{5}{2}}(t-0)^3 \frac{1}{6} - \frac{15}{16}(1+0)^{-\frac{7}{2}}(t-0)^4 \frac{1}{24} \\ T(t) &= 1 + \frac{1}{2}t - \frac{1}{8}t^2 + \frac{1}{16}t^3 - \frac{5}{128}t^4\end{aligned}$$

3.1.2

eine Ableitung mehr als in 3.1.1 und $g^{(n)}(t) = f^{(n+1)}(t)$

$$\begin{aligned}g(t) &= (1+t)^{-\frac{1}{2}} \\ g'(t) &= -\frac{1}{2}(1+t)^{-\frac{3}{2}} \\ g''(t) &= \frac{3}{4}(1+t)^{-\frac{5}{2}} \\ g'''(t) &= -\frac{15}{8}(1+t)^{-\frac{7}{2}} \\ g^4(t) &= \frac{105}{16}(1+t)^{-\frac{9}{2}} \\ T(t) &= 1 - \frac{1}{2}t + \frac{3}{8}t^2 - \frac{5}{16}t^3 + \frac{35}{128}t^4\end{aligned}$$

3.1.3

$$\begin{aligned}f(t) &= \ln\left(\frac{1+t}{1-t}\right) = \ln(1+t) - \ln(1-t) \\ f'(t) &= \frac{1}{1+t} + \frac{1}{1-t} \\ f''(t) &= -\frac{1}{(1+t)^2} + \frac{1}{(1-t)^2} \\ f'''(t) &= \frac{2}{(1+t)^3} + \frac{2}{(1-t)^3} \\ f^{(4)}(t) &= -\frac{6}{(1+t)^4} + \frac{6}{(1-t)^4} \\ f^{(5)}(t) &= \frac{24}{(1+t)^5} + \frac{24}{(1-t)^5}\end{aligned}$$

$$T(t) = 2t + \frac{2}{3}t^3 + \frac{2}{5}t^5$$

3.1.4

$$\begin{aligned}f(t) &= \tan(t) \\ f'(t) &= 1 + \tan^2(t) \\ f''(t) &= 2 \tan(t) (1 + \tan^2(t)) = 2 \tan(t) + 2 \tan^3(t) \\ f'''(t) &= 2 + 2 \tan^2(t) + 6 \tan^2(t) (1 + \tan^2(t)) \\ &= 2 + 8 \tan^2(t) + 6 \tan^4(t) \\ f^{(4)}(t) &= 16 \tan(t) (1 + \tan^2(t)) + 24 \tan^3(t) (1 + \tan^2(t)) \\ &= 16 \tan(t) + 40 \tan^3(t) + 24 \tan^5(t) \\ f^{(5)}(t) &= 16 (1 + \tan^2(t)) + 120 \tan^2(t) (1 + \tan^2(t)) + \\ &\quad 120 \tan^4(t) (1 + \tan^2(t)) \\ &= 16 + 136 \tan^2(t) + 240 \tan^4(t) + 120 \tan^6(t)\end{aligned}$$

3.2

$$\begin{aligned}\frac{1+t}{1-t} &= 2 \\ 1+t &= 2-2t \\ 3t &= \frac{1}{t} \\ t &= \frac{1}{3}\end{aligned}$$

$$T\left(\frac{1}{3}\right) = 2\frac{1}{3} + \frac{2}{3}\left(\frac{1}{3}\right)^3 + \frac{2}{5}\left(\frac{1}{3}\right)^5 = \frac{2}{3} + \frac{2}{81} + 21215$$

$$T\left(\frac{1}{3}\right) = \frac{842}{1215} = 0.69300$$

Zum Vergleich $\ln(2) = 0.69315$ der Fehler ist sicher kleiner $t^7 < 0.00046$.

4 Taylorpolynome verschiedenen Grades

```
> series(sin(t),t=0,1);
```

$$0(t)$$

```
> series(sin(t),t=0,3);
```

$$t + 0(t^3)$$

```
> series(sin(t),t=0,5);
```

$$t - \frac{1}{6}t^3 + 0(t^5)$$

```
> series(sin(t),t=0,7);
```


$$t - \frac{1}{6}t^3 + \frac{1}{120}t^5 + 0(t^7)$$

allgemein:

$$\sin t = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{t^{2k+1}}{(2k+1)!}$$

5 komplexe Zahlen

5.1



5.2

5.2.1

$$z = \frac{5-5i}{-1+2i} = \frac{(5-5i)(-1-2i)}{(-1+2i)(-1-2i)} = \frac{-5-10i+5i+10i^2}{1-4i^2} = \frac{-15-5i}{5}$$

$$z = -3-i$$

5.2.2

$$z = \frac{1}{(1+2i)^3} = \frac{(1-2i)^3}{((1+2i)(1-2i))^3} = \frac{(-3-4i)(1-2i)}{(1-4i^2)^3} = \frac{-11+2i}{5^3}$$

$$z = \frac{-11}{125} + \frac{2}{125}i$$