Ursprung und Erhaltung genetischer Variation

Thema 5

Genotyp und Phänotyp

Ursprung u. Erhaltung genetischer Variation

Ursprung u. Erhaltung genetischer Variation

Ursprung u. Erhaltung genetischer Variation

H = % der heterozygoten Loci unter allen Individuen

Locus	Enzym	H
AcpH	Acid phosphotase	0.52
Pgm-1	Phosphoglucomutase-1	0,36
Pgm-2	Phosphoglucomutase-2	0.38
Adk	Adenylate kinase	0,09
Pept-A	Peptidase-A	0,37
Pept-C	Peptidase-C	0,02
Pept-D	Peptidase-D	0.02
Adn	Adenosine deaminase	0.11
6Pgdh	6-Phosphogluconate dehydrogenase	0.05
Aph	Alkaline phosphatase (placental)	0.53
Amy	Amylase (pancreatic)	0.09
Gpt	Glutamate-pyruvate transaminase	0.50

(gemessen: 71 Loci bei Europäern)

after Harris & Hopkinson (1972) J. Human Genet 36:9
(Ayala 1982, Tab.2.9)

Drosophila

FH3, Fig 4.14

Ursprung u. Erhaltung genetischer Variation

Ursprung u. Erhaltung genetischer Variation

First base	Second base												Third base
	U			C			A			G			
U	UUU	Phenylalanine	F	UCU	Serine	S	UAU	Tyrosine	Y	UGU	Cysteine	C	U C A G
	UUC	Phenylalanine	F	UCC	Serine	S	UAC	Tyrosine	Y	UGC	Cysteine	C	
	UUA	Leucine	L	UCA	Serine	S	UAA	Stop		UGA	Stop		
	UUG	Leucine	L	UCG	Serine	S	UAG	Stop		UGG	Tryptophan	W	
C	CUU	Leucine	L	CCU	Proline	P	CAU	Histidine	H	CGU	Arginine	R	U C A G
	CUC	Leucine	L	CCC	Proline	P	CAC	Histidine	H	CGC	Arginine	R	
	CUA	Leucine	L	CCA	Proline	P	CAA	Glutamine	Q	CGA	Arginine	R	
	CUG	Leucine	L	CCG	Proline	P	CAG	Glutamine	Q	CGG	Arginine	R	
A	AUU	Isoleucine	I	ACU	Threonine	T	AAU	Asparagine	N	AGU	Serine	S	U C A G
	AUC	Isoleucine	I	ACC	Threonine	T	AAC	Asparagine	N	AGC	Serine	S	
	AUA	Isoleucine	I	ACA	Threonine	T	AAA	Lysine	K	AGA	Arginine	R	
	AUG	Start (Methionine M)		ACG	Threonine	T	AAG	Lysine	K	AGG	Arginine	R	
G	GUU	Valine	V	GCU	Alanine	A	GAU	Aspartic Acid	D	GGU	Glycine	G	U C A G
	GUC	Valine	V	GCC	Alanine	A	GAC	Aspartic Acid	D	GGC	Glycine	G	
	GUA	Valine	V	GCA	Alanine	A	GAA	Glutamic Acid	E	GGA	Glycine	G	
	GUG	Valine	V	GCG	Alanine	A	GAG	Glutamic Acid	E	GGG	Glycine	G	

RNA Codon Amino acid Abbreviation

FH3, Fig 2.15

Sewall Wright

Ursprung u. Erhaltung genetischer Variation

FH3, Fig 4..5

Organism	Mutation	Value	Units
<i>Bacteriophage T2</i> (bacterial virus)	Lysis inhibition $r \rightarrow r^+$	1×10^{-8}	} Rate: mutant genes per gene replication
	Host range $h^+ \rightarrow h$	3×10^{-9}	
<i>Escherichia coli</i> (bacterium)	Lactose fermentation $lac^- \rightarrow lac^+$	2×10^{-7}	} Rate: mutant cells per cell division
	Histidine requirement $his^- \rightarrow his^+$	4×10^{-8}	
	$his^+ \rightarrow his^-$	2×10^{-6}	
<i>Chlamydomonas reinhardtii</i> (alga)	Streptomycin sensitivity $str^+ \rightarrow str^-$	1×10^{-6}	} Frequency per asexual spore
<i>Neurospora crassa</i> (fungus)	Inositol requirement $inos^- \rightarrow inos^+$	8×10^{-8}	
	adenine requirement $ad^- \rightarrow ad^+$	4×10^{-8}	
<i>Drosophila melanogaster</i> (fruit fly)	Eye color $W \rightarrow w$	4×10^{-5}	} Frequency per gamete
Mouse	Dilution $D \rightarrow d$	3×10^{-5}	
Human to autosomal dominants	Huntington's chorea	0.1×10^{-5}	
	Nail-patella syndrome	0.2×10^{-5}	
	Epiloia (predisposition to a type of brain tumor)	$0.4-0.8 \times 10^{-5}$	
	Multiple polyposis of large intestine	$1-3 \times 10^{-5}$	
to X-linked recessives	Achondroplasia (dwarfism)	$4-12 \times 10^{-5}$	
	Neurofibromatosis (predisposition to tumors of nervous system)	$3-25 \times 10^{-5}$	
	Hemophilia A	$2-4 \times 10^{-5}$	
in bone-marrow tissue-culture cells	Duchenne's muscular dystrophy	$4-10 \times 10^{-5}$	} Rate: mutant cells per cell division
	Normal $\rightarrow$ azaguanine resistance	7×10^{-4}	

FH, Tab.4.2, 4.1

Ursprung u. Erhaltung genetischer Variation

Ursprung u. Erhaltung genetischer Variation

Ursprung u. Erhaltung genetischer Variation

Ursprung u. Erhaltung genetischer Variation

Ursprung u. Erhaltung genetischer Variation

Table 6.4 Changes in genotype frequencies with successive generations of selfing

The frequency of allele A_1 is p and the frequency of allele A_2 is q . Note that allele frequencies do not change from generation to generation—only the genotype frequencies. After Crow (1983).

Generation	Frequency of		
	A_1A_1	A_1A_2	A_2A_2
0	p^2	$2pq$	q^2
1	$p^2 + (pq/2)$	pq	$q^2 + (pq/2)$
2	$p^2 + (3pq/4)$	$pq/2$	$q^2 + (3pq/4)$
3	$p^2 + (7pq/8)$	$pq/4$	$q^2 + (7pq/8)$
4	$p^2 + (15pq/16)$	$pq/8$	$q^2 + (15pq/16)$

FH3, Tab. 6.4

FH3, Fig 6.27

Ursprung u. Erhaltung genetischer Variation

Ursprung u. Erhaltung genetischer Variation

Ursprung u. Erhaltung genetischer Variation

Ursprung u. Erhaltung genetischer Variation

FH3, Fig 6.17

FH3, Fig 6.19

Zystische Fibrose

normal

betroffen

FH3, Fig 5.26

Diego Velazquez: Las Meniñas (1656)

Ursprung u. Erhaltung genetischer Variation

Malaria und Hämozyten

Ursprung u. Erhaltung genetischer Variation

Ursprung u. Erhaltung genetischer Variation

FH3, Fig 6.9

Ursprung u. Erhaltung genetischer Variation